

5 Zusammenfassung (tabellarisch)

Diagnose	Einzeldosis	Gesamtdosis	Evidenzlevel	Empfehlungsgrad
Gonarthrose	0,5 bis 1 Gy	3 bis 6 Gy	2c	C
Koxarthrose	0,5 bis 1 Gy	3 bis 6 Gy	4	C
Arthrosen der kleinen Gelenke	0,5 bis 1 Gy	3 bis 6 Gy	4	C
Schultersyndrom	0,5 bis 1 Gy	3 bis 6 Gy	4	C
Bursitis trochanterica	0,5 bis 1 Gy	3 bis 6 Gy	4	C
Kalkaneodynie	0,5 Gy	3 Gy	1 b	A
Ellenbogensyndrom	0,5 Gy	3 Gy	2 c	B
Morbus Dupuytren (im aktiven Stadium der „Knotenbildung“)	3 Gy	15 Gy (Wiederholung der Serie nach 8-12 Wochen)	2c	B
Morbus Ledderhose (bei zunehmender Symptomatik sowohl primär als auch sekundär nach OP)	3 Gy	15 Gy (Wiederholung der Serie nach 8-12 Wochen)	4	C
Keloid	3 Gy	12 Gy	4	C
Gorham Stout Syndrom	1,8 bis 2 Gy	36 bis 45 Gy	3	B
Induratio penis plastica	2 bis 3 Gy	10 bis 20 Gy	3b	C
Heterotope Ossifikationen	7 Gy	7 Gy	1	A
Endokrine Orbitopathie (frühe entzündliche Phase)	0,3 bis 2 Gy	2,4 bis 16 Gy	2	B
Endokrine Orbitopathie (fortgeschrittene Erkrankung)	2 Gy	16 bis 20 Gy	2	B
Lymphfisteln	0,3 bis 3 Gy	1 bis 15 Gy	4	C
Wirbelkörperhämangiome	2 Gy	34 bis 36 Gy	2 c	B
Pigmentierte villonoduläre Synovitis	1,8 bis 2 Gy	36 bis 40 Gy	2 c	B
Desmoid	1,8 bis 2 Gy	50 bis 65 Gy	4	C
Gynäkomastie (Prophylaxe)	3 Gy	9 bis 15 Gy	1	A

Tabelle 20. Kurzübersicht über die Indikationen, Bestrahlungsdosierungen, Evidenzlevel und Empfehlungsgrade